

# Chou blanc (chou à choucroute) pour la fabrication de choucroute «Thurner Selektion ZEFA»

(*Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba*)

Obtenteur: Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil  
 Représentant: (DSP) Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

## Origine et travaux de sélection

Le chou à choucroute 'Thurner' est une lignée du chou à choucroute 'Wädenswiler', sa culture se pratique principalement dans le Gürbetal. Dans les années 70, la qualité de la variété commence à diminuer, car les connaissances de la sélection conservatrice, bien connue des anciens sélectionneurs, se perd de plus en plus. La station de recherches de Wädenswil est alors chargée du maintien et de l'amélioration de la variété. On pratique des croisements par paires. La sélection arrive sur le marché en 1980.

## Caractères morphologiques

**Pied:** moyennement long, effilé

**Feuilles:** les feuilles extérieures (manchettes) et de recouvrement sont grises bleuâtres, recouvertes de cire, finement nervurées.

Les feuilles de la pomme sont de couleur blanche.

**Forme de la tête:** ronde, élevée, bien couverte et très dense.

**"Tronc" (attache des feuilles):** court  
 Il en résulte une choucroute fine et longue, de couleur blanche et de très haute qualité.

## Caractères agronomiques

### Rendement

Elevé.

### Homogénéité

Forme et grandeur de la tête: bonne  
 Qualité interne: très bonne

## Directives culturales

### Utilisation

Pour la fabrication de la choucroute. S'apprête aussi très bien en salade.

### Semis

Début mars à début avril (selon les conditions en pépinière)

### Indications pour la plantation

Ecartement entre les lignes: 65 à 80 cm  
 Ecartement sur la ligne: 65 à 75 cm

### Protection des plantes

Utiliser uniquement des semences traitées. Mettre en place la pépinière dans un sol non contaminé.

Le chou à choucroute 'Thurner Selektion ZEFA' est sensible aux mêmes parasites que les autres crucifères. Il convient de surveiller attentivement le développement des ravageurs, en particulier les altises, les tipules, les vers gris, les larves de la piéride du chou, la noctuelle du chou et le puceron cendré du chou. Il faut intervenir en cas de nécessité. En ce qui concerne les maladies, on prêtera une attention particulière à l'alternariose du chou et aux pourritures bactériennes connues.

### Récolte

'Thurner Selektion ZEFA' est considéré, parmi les variétés à pollinisation libre, comme une variété mi-tardive à tardive (après 'ZEFA Wädenswiler'). Il existe, pour les variétés à pollinisation libre, une certaine hétérogénéité de maturité.

Grace à un temps de culture quelques peu long, ce chou forme des pommes ferme et compacte. Il en ressort une choucroute très fine et blanche.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp. Buser); traduction: V. Berther, DSP Delley. Mai 1994



Das eingeschnittene Kraut wird für die Einsäuerung weiter verarbeitet.

Les feuilles râpées sont prêtes pour la fermentation ("choucroute").



Der Samenbau findet nur noch in Hochtunnels statt. Man erreicht damit eine sichere Ernte von qualitativ gutem Handelssaatgut. – La culture pour la semence se fait encore uniquement sous tunnel. On peut atteindre ainsi une récolte sûre et une semence de commerce de bonne qualité.