

Chou blanc (chou à choucroute) pour la fabrication de choucroute «ZEFA Wädenswiler»

(*Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba*)

Obtenteur: Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil
 Représentant: (DSP) Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

Origine et travaux de sélection

En 1927, on a débuté la sélection de la variété locale "Thurner" du Gürbetal, issue de populations locales du sud de l'Allemagne, pour l'améliorer et la rendre plus homogène. Pour augmenter sa résistance à la verse, les plantes de type "piéd court" ont été croisées par paires. La qualité interne a été améliorée grâce à des essais de fermentation poursuivis en parallèle. Cette remarquable variété de chou à choucroute arriva dans le commerce en 1941.

Caractères morphologiques

Pied: court

Feuilles: les feuilles extérieures (manchettes) et de recouvrement sont gris-vert, recouvertes de cire, finement nervurées.

Les feuilles de la pomme sont de couleur blanche.

Forme de la tête: ronde, bien couverte et très dense.

"Tronc" (attache des feuilles): court. Il en résulte une choucroute fine et longue, de couleur blanche et de très haute qualité.

Caractères agronomiques

Rendement

Elevé.

Homogénéité

Forme et grandeur de la tête: bonne
 Qualité interne: très bonne

Directives culturales

Utilisation

Pour la fabrication de la choucroute. S'apprête aussi très bien en salade.

Semis

Début mars à début avril (selon les conditions en pépinière)

Indications pour la plantation

Ecartement entre les lignes: 65 à 80 cm
 Ecartement sur la ligne: 65 à 75 cm

Protection des plantes

Utiliser uniquement des semences traitées. Mettre en place la pépinière dans un sol désinfecté.

Le chou à choucroute 'Thurner Sélection ZEFA' est sensible aux mêmes parasites que les autres crucifères. Il convient de surveiller attentivement le développement des ravageurs, en particulier les altises, les tipules, les vers gris, les larves de la piéride du chou, la noctuelle du chou et le puceron cendré du chou. Il faut intervenir en cas de nécessité. En ce qui concerne les maladies, on prêtera une attention particulière à l'alternariose du chou et aux pourritures bactériennes connues.

Récolte

'ZEFA Wädenswiler' est considéré, parmi les variétés à pollinisation libre, comme une variété mi-précoce (après les variétés hybrides et avant 'Thurner Sélection ZEFA').


Il existe, pour les variétés à pollinisation libre une certaine hétérogénéité de la maturité.

Ce rustique chou à choucroute sélectionné en Suisse supporte très bien les conditions de cultures difficiles et donne, après préparation, une choucroute blanche de très bon goût.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp. Buser); traduction: V. Berther, DSP Delley. Mai 1994



Vor dem Einschneiden müssen die Innenstrünke ausgebohrt werden.
 Avant de râper le chou, le tronc doit être enlevé.



Frisch eingefülltes Sauerkraut im Silo.
 Remplissage d'un silo avec de la choucroute fraîche.