



# Oignon «ZEFA Rouge de Wädenswil» (*Allium cepa* L.)

**Obtenteur:** Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil

**Représentant:** (DSP) Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

## Origine et travaux de sélection

Le matériel de base utilisé, provient d'une variété locale trouvée à Klettgau (SH).

Après un examen de la descendance de chaque plante, une variété a pu être sélectionnée. Cette variété est maintenue en lignées.

## Caractères morphologiques

**Forme:** ronde aplatie à sphérique avec un plateau racinaire légèrement surélevé. Col épais et bien fermé.

**Pelure:** rouge foncé.

**Fermeté de la pelure:** très bonne pour les oignons provenant d'un semis direct ou de plantons. Un peu moins bonne pour les oignons issus de bulbilles.

**Chair:** les pellicules situées entre les écailles sont également colorées en rouge. Elles se colorent encore plus intensément durant la conservation.

## Caractères agronomiques

### Rendement

(oignon à repiquer): très bon.  
(oignon): bon.

## Homogénéité

Couleur et aspect extérieur: bons

Forme: bonne.

## Résistance à la montaison

Très bonne pour les oignons produits à partir de plantons ou d'un semis direct. Pour la culture à partir de bulbilles il faut compter avec plus ou moins de montée à graine selon les conditions de production et le calibre des bulbilles.

9 à 14 mm : environ 2%,  
15 à 18 mm : environ 15%  
18 à 22 mm : environ 54%.

Pour diminuer la montée à graine et obtenir une récolte plus précoce et plus importante, les bulbilles doivent être stockées à 30–40° durant les 3 à 4 semaines précédant le repiquage ou alors stockées à température ambiante (18 à 20°) durant tout l'hiver.

## Aptitude à la conservation

Très bonne; se conserve aussi dans des conditions naturelles jusqu'en avril-mai.

## Directives culturales

### Aptitudes culturales

Particulièrement adaptée pour la culture à partir de semis direct ou de plantons. La qualité extérieure de l'oignon (couleur, aspect extérieur, fermeté de la pelure) laisse quelque peu à désirer dans les cultures mises en place avec des bulbilles.

## Semis

Production de bulbilles: de mars à début mai.

Semis direct: le plus tôt possible (mars).  
Production de plantons: de mi-janvier à mi-février.

Plantation des bulbilles: avril.

## Protection des plantes

Cette variété ne présente pas de sensibilités particulières. Elle est moins sensible au botritis que les autres variétés. Prévoir les mesures sanitaires usuelles nécessaires en cultures d'oignons.

## Récolte

Le plus tôt possible jusqu'à début août, quand environ le 60% des fûts (tiges) sont secs. Bien laisser sécher les oignons récoltés (si possible avec ventilation artificielle) et stocker dans un endroit bien ventilé. Pendant le stockage contrôler à plusieurs reprises.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp. Buser).  
Trad: F. Fournier, DSP, octobre 1995



Die Zwiebel, «ZEFA rote Wädenswiler» muss geerntet werden, wenn etwa 60% der Rohre geknickt sind.  
L'oignon «ZEFA rouge de Wädenswil» doit être cueilli quand 60% des fûts sont secs.



Wunderbar blühender Zwiebelbestand für die Produktion von Zwiebelsamen.  
Magnifique fleur d'oignon destinée à la production de semences.