



Blätter, in kühlen Lagen auch im Sommer geeignet.  
Für kontinuierliche Ernte ist satzweiser Anbau mit Saatabständen von ca. 10 Tagen wichtig. Möglichst mehrere Sorten pro Satz anbauen. Im Sommer können Direktsaaten sinnvoll sein, wenn man nur schlecht wässern kann.  
Mischkulturen : Bohnen, Fenchel, Kohl, Radieschen, Randen, Tomaten  
Wärmebedarf : mittelhoch (frostepfindlich)

Nährstoffbedarf : mittel  
Anbaupause : möglichst nur alle 4 Jahre am gleichen Ort  
Abstand : 25x25 cm - 30x30 cm

~~12.0005~~

12.1027

ATTRAKTION

## Kopfsalat Freiland

### Laitue pommée

ATTRAKTION

Salade type "beurre". Bonne variété de fin de printemps, qui forme de grosses pommes blondes aux feuilles tendres. Dans les sites plus frais convient aussi pour la culture d'été."

Pour une récolte continue, cultiver en séries échelonnées, tous les 10 jours env., en utilisant plusieurs variétés par série. Il peut être avantageux de pratiquer le semis direct en été si l'on ne peut pas irriguer

Besoin en chaleur: sensibilité moyenne à la gelée

Besoin en fumure: moyen

Assolement: si possible pas avant 4 années à la même place

Espacement : 25x25 cm - 30x30 cm

**sativa**  
ethnischke Pflanz- und Saatgut

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Aussaat Haus													Semis sous serre
Aussaat Freiland													Semis direct
Pflanzung													Plantation
Ernte													Récolte

Verbrauch bis/Date limite d'util.: 2012; Port=1,25g Charge: 3208  
Bio-Zertifizierung/Certification: bio.inspecta AG/CH-BIO-SCESP 006  
Erh. Abfüllmenge(Keimf.)/Quant. majorée (germinabilité): —  
Lizenznehmer/Détenteur Demeter/Knospe: Sativa Rheinau AG